

INDICACIONES GENERALES

- 1- Paciente debe traer orden médica.
- 2- Paciente debe asistir con su carnet de identidad o pasaporte (paciente extranjero).
- 3- Suspender medicamentos que contengan METFORMINA. (Glaformil, Glucophage, Hipoglucin, Janumet etc.). El resto de sus medicamentos puede tomarlos de forma habitual (Siempre bajo la autorización de su médico tratante).
- 4- Ayuno de sólidos al menos 4 horas antes de su examen. (Puede hidratarse con agua mineral sin gas).
- 5- Asistir con ropa cómoda, sin joyas ni elementos metálicos.
- 6- Traer exámenes anteriores (Biopsias, Ecografía, Scanner, Resonancia Magnética, Cintigramas) y antecedentes previos asociados al diagnóstico.
- 7- Puede asistir solo o acompañado, 1 solo acompañante (no deben asistir mujeres embarazadas y/o niños).
- 8- Si está en **diálisis**, no hay contraindicación para el uso de medio de contraste, coordinar en forma habitual.
- 9- Si posee orden para exámenes de laboratorio, realizar antes del TAC contrastado, de lo contrario, deberá realizarlos 24 horas después.
- 10- Traer examen de creatinina para pacientes mayores a 65 años, diabéticos, con mieloma múltiple, cáncer hepático o renal, con antigüedad no mayor a 30 días.
- 11- El valor de Creatinina sérica máximo aceptado, es de 1,8 mg/dl y posee una validez de 30 días. Por sobre este valor, hay contraindicación relativa el uso de medio de contraste y el paciente deberá ser derivado a tecnólogo médico para evaluar su caso. Lo mismo aplica, si posee examen de creatinina por sobre los 30 días.

Favor informar al centro si tiene algún antecedente de alergia al medio de contraste yodado, alergias graves a algún medicamento o antecedentes de shock anafiláctico producto del uso de medios de contrastes yodados y/o medicamentos.

INDICACIONES PARA PACIENTE DIABÉTICO QUE CONSUME METFORMINA Y DEBE REALIZAR EXAMEN CON MEDIO DE CONTRASTE YODADO ENDOVENOSO

Previo a la realización de un examen con uso de medio de contraste endovenoso, el paciente diabético debe consultar con su médico tratante las indicaciones a seguir posterior a la administración del medio de contraste, pues deberá suspender su hipoglicemiante el día del examen y 48 horas después de la realización para evitar cualquier complicación derivada del uso en conjunto de la metformina y el medio de contraste.

INDICACIÓN:

1. Debe suspender administración de **METFORMINA** 48Hrs. antes del día del examen.
2. Durante las 48 horas posteriores al examen, **no debe ingerir hipoglicemiantes que contengan metformina**, en su reemplazo debe usar otro medicamento indicado previamente por su diabetólogo.